KATALOG

BMS Micro – Nutrients *Slovenija*

BMS MICRO-NUTRIENTS

BMS mikro hranila v prehrani hmelja

Fructol®



Pakiranje: 1 kg in 5 kg

Lastnosti:
NPK(Mg) foliarno gnojilo, 5-8-15(4) z borom (B), železom (Fe), manganom (Mn), molibdenom (Mo) in cinkom (Zn).

Vsebnost hranil:
Primarna hranila: skupni dušik (N): 5,0 % (3,5 % nitratnega N in 1,5 % amonijskega N); amonijsko-citratno topni fosforjev pentoksid (P_2O_5): 8,0 %: vodotopni fosforjev pentoksid (P_2O_5): 8,0 %; vodotopni kalijev oksid (K_2O): 15,0 %. *Sekundarno hranilo:* Vodotopen magnezijev oksid (MgO): 4,0 %. *Mikro hranila:* vodotopni bor (B): 2 %; vodotopno železo (Fe): 0,8 % kot kelat DTPA in EDTA; vodotopni magnezij (Mn): 0,8 % kot kelat EDTA; vodotopni molibden (Mo): 0,08 % kot kelat EDTA; vodotopni cink (Zn): 0,8 % kelat EDTA.

Uporaba:
Spodbuja in uravnava rast rastlin ter pozitivno vpliva na kakovost pridelka. Zaradi spodbujanja rasti ga priporočamo ob pojavu 'kržljavosti', v stresnih razmerah in v razmerah neuravnotežene prehrane rastlin. Do višine hmelja okrog 2,5 m (BBCH 30) priporočamo Fructol v odmerku od 1,0 do 1,5 kg na hektar, v kasnejših razvojnih stadijih v odmerku 2,0 kg na hektar. Gnojilo se meša z večino fitofarmacevtskimi sredstvi, razen s sredstvi na osnovi olja.

Kappa V/G

Pakiranje: 5 kg

Lastnosti:
Kappa V je NPK gnojilo, 18-12-27, z borom (B) in železom (Fe), ki ga uporabljamo za foliarno prehrano rastlin.

Vsebnost hranil:
Primarna hranila: skupni dušik (N): 18 % (7,0 % nitratnega N, 1,5 % amonijskega in 9,5 % amidnega N); amonijsko-citratno topni fosforjev pentoksid (P_2O_5): 12,0 %: vodotopni fosforjev pentoksid (P_2O_5): 12,0 %; Vodotopni kalijev oksid (K_2O): 27,0 %. *Mikro hranila:* vodnotopni bor (B): 0,3 %; vodnotopno železo (Fe): 0,25 % kot kelat EDTA.

Uporaba:
Kappa V vsebuje rastlinam hitro dostopne oblike dušika, zaradi česar spodbuja rast rastlin. Uporabo tega gnojila zato priporočamo v času vegetativnega razvoja hmelja, t.j. v obdobju intenzivne rasti poganjkov in naraščanja asimilacijske površine rastlin. Zato je Kappa V priporočljivo uporabiti prvič pri višini rastlin od 2,5 m do 4,5 m (BBCH 31 - 36), v odmerku 2 - 3 kg/ha, kasneje, pred nastopom fenofaze hmelj cveti (BBCH 65), pa v odmerku od 2 do 4 kg/ha. Gnojilo se meša z večino fitofarmacevtskimi sredstvi, razen s sredstvi na osnovi olja.

Lastnosti:
Kappa G je NPK gnojilo, 8,5-20-30, z železom (Fe), ki ga uporabljamo za foliarno prehrano rastlin.
Primarna hranila: skupni dušik (N): 8,5 % (6,5 % nitratnega N, 2,0 % amonijskega N); amonijsko-citratno topni fosforjev pentoksid (P_2O_5): 20,0 %: vodotopni fosforjev pentoksid (P_2O_5): 20,0 %; Vodotopni kalijev oksid (K_2O): 30,0 %. *Mikro hranilo:* vodnotopno železo (Fe): 0,25 % kot kelat EDTA.

Uporaba:
Glede na sestavo in deleža posameznih hranil ima Kappa G stimulativen vpliv na razvoj generativnih organov rastlin. Pri hmelju priporočamo enkratno uporabo tega gnojila, in sicer v obdobju od konca cvetenja (BBCH 69) do začetka oblikovanja storžkov (BBCH 71), v odmerku 2,0 kg/ha. Gnojilo se meša z večino fitofarmacevtskimi sredstvi, razen s sredstvi na osnovi olja.

BMS mikro hranila v prehrani hmelja

Kappa PK

Pakiranje: 6 kg, 25 kg in 250 kg

Lastnosti:
Tekoče foliarno gnojilo PK z visoko vsebnostjo fosforja in kalija. Uporaba tega gnojila spodbuja v rastlinah naravne zaščitne mehanizme, ko je npr. nastajanje fitoaleksinov.

Sestava:
Gnojilo v raztopini PK 28.24 z nizko vsebnostjo klora. Fosforjev oksid (P_2O_5), vodotopen: 28 %; kalijev oksid (K_2O): 24 %.

Uporaba:
Gnojilo je mogoče uporabljati v vseh razvojnih fazah hmelja, še posebno v generativnem obdobju, t.j. od začetka cvetenja do fenofaze storžki so oblikovani (BBCH 61 – BBCH 85). S tem hranilom ne vplivamo le na boljšo oskrbo rastlin hmelja s kalijem, ampak krepimo tudi njihovo naravno odpornost, kar je v obdobju občutljivem za pojav bolezni še posebno pomembno. Priporočen odmerek gnojila Kappa PK je od 1,0 do 2,0 kg/ha. Gnojilo se meša z večino fitofarmacevtskimi sredstvi, razen s sredstvi na osnovi olja.

Chelal® Kubig

Pakiranje: 5 L

Lastnosti:
Baker (Cu) v kelatni obliki, namenjen izključno za listno uporabo. Gnojilo je razvito z namenom krepitve imunskega sistema t.j. odpornosti rastlin. Baker sodeluje v rastlini tudi pri tvorbi ligninov, kar povečuje fizikalno odpornost rastlin.

Sestava:
Vodotopni baker (Cu): 8,0 %; Delež v kelatni obliki: 8,0 %, tvorec kelata; TEPA; vsebnost tvorca kelata : 24,0 %.

Uporaba:
Uporabo gnojila Chelal Kubig priporočamo v obdobju od začetka cvetenja (BBCH 61) do nastopa fenofaze storžki so oblikovani (BBCH 85). Priporočen odmerek gnojila je od 1,0 do 1,5 L/ha. Gnojilo se meša z večino fitofarmacevtskimi sredstvi, razen s sredstvi na osnovi olja.

PROIZVAJALEC:

BMS Micro-Nutrients NV
Rijksweg 32 – 2880 Bornem - Belgium
Tel.: + 32 3 899 10 10; Fax: 00 32 3 899 40 45
www.chelal.com; info@chelal.com

ZASTOPSTVO IN PRODAJA:

Hmezad
exim d.d. Žalec

Informacije in naročila: 03 713 49 14